

MUV AUTORIZADOS PARA ABELHAS

NOME	TITULAR AIM	Nº DA AIM	SUBSTÂNCIA ACTIVA	INTERVALO DE SEGURANÇA	INDICAÇÕES
API-Bioxal, 886 mg/g pó para uso em colmeias	CHEMICALS LAIF S.P.A.	929/01/15RFVPT	Ácido oxálico di-hidratado 886 mg (equivalente a 632,70 mg de anidro)	Mel: Zero dias Não colher o mel durante o período de tratamento.	Abelhas (Apis mellifera): Tratamento da varroose (Varroa destructor, parasita de Apis mellifera).
MAQS Ácido fórmico 68,2 g Tiras para colmeia para abelhas melíferas	NOD Europe Ltd	793/01/14RFVPT	Ácido fórmico: 68,2 g	Mel: Zero dias. Não colher o mel durante o período de tratamento de 7 dias.	Tratamento da varroose causada pelo Varroa destructor em abelhas melíferas (Apis mellifera).
APITRAZ 500 mg tiras para colmeias de abelhas	CALIER PORTUGAL, S.A.	667/01/13DFVPT	Amitraz 500 mg	Mel: zero dias Não aplicar durante a produção do mel.	Tratamento das parasitoses externas causadas pela Varroa destructor, sensível ao Amitraz.
APIVAR 500 mg, bandas antiparasitárias para abelhas melíferas	QALIAN Portugal - Sociedade Comercial de Produtos Agropecuários Unipessoal, Lda.	564/01/12NFVPT	Barras com as dimensões 20x4x0,2 cm, impregnadas com o princípio activo: Amitraz 500 mg	Mel e outros produtos apícolas (polén, cera e propolis): zero dias	Tratamento da Varroose (Varroa destructor) em colónias de abelhas-do-mel
APILIFE VAR tira para colmeias de abelhas	CHEMICALS LAIF S.P.A.	569/01/12RFVPT	Timol 8,00 g Óleo de eucalipto 1,72 g Cânfora racêmica 0,39 g Levomentol 0,39 g	Mel: Zero dias Não utilizar durante a produção do mel para evitar alteração do sabor do mel.	Tratamento da varroose causada pela Varroa destructor.
APIGUARD 25% timol por tira para colmeia de abelhas do mel	Hifarmax, produtos e serviços veterinários, Lda	501/01/12NFVPT	Timol 25% p/p por 50 g de gel	Mel, zero dias Não utilizar antes ou durante a cresta.	Tratamento da varroose em abelhas do mel (Apis mellifera) causada pelo acaro Varroa (Varroa destructor).

NOME	TITULAR AIM	Nº DA AIM	SUBSTÂNCIA ACTIVA	INTERVALO DE SEGURANÇA	INDICAÇÕES
Apistan 0,8g / tira antiparasitária para colmeias	Hifarmax, produtos e serviços veterinários, Lda	500/01/12NFVPT	Tau- Fluvalinato a 10% w/w, ou seja, 800mg por banda de 8g	Mel, zero dias Não utilizar durante o fluxo de mel.	Tratamento da Varroose (Varroa destructor) em colónias de abelhas melíferas
Bayvarol 3,6 mg tira para colmeia	Bayer Portugal S.A.	468/01/12NFVPT	Flumetrina 3,6 mg	Mel: Zero dias. Outros produtos das abelhas não deverão ser destinados ao consumo humano até à Primavera seguinte ao tratamento.	Diagnóstico e controlo de Varroa jacobsoni sensível à flumetrina em abelhas melíferas.
THYMOVAR	Andermatt BioVet GmbH.	083/01/08RFVPT	Cada placa de colmeia contém: Substância activa: 15 g de timol Excipientes: 5,8 g de tela esponjosa de celulose	Mel: Zero dias. Não utilizar antes ou durante a cresta. Os favos de nidificação, que estejam presentes quando a colónia for tratada com o medicamento, não devem ser extraídos na Primavera seguinte.	Tratamento da varroose em abelhas do mel (Apis mellifera) causada pelo ácaro Varroa (Varroa destructor).